

Concours d'accès aux licences professionnelles
Sage-Femme & Sciences Infirmières
Epreuve de Mathématique

QCM 1 : Soient (u_n) , (v_n) et (w_n) trois suites telles que :

- $v_n \leq u_n \leq w_n$, pour tout entier n
- $\lim_{n \rightarrow \infty} v_n = 0$, $\lim_{n \rightarrow \infty} w_n = 1$

Alors :

	Vrai	Faux
$\lim_{n \rightarrow \infty} u_n = 0$		
(u_n) est minorée		
(u_n) est majorée par 1		
Si $\lim_{n \rightarrow \infty} u_n = a$, on a : $0 \leq a \leq 1$		

QCM 2 : Soit (u_n) une suite telle que :

- $u_0 = 2$
- $u_{n+1} = 2u_n - 1$

Alors :

	Vrai	Faux
$\lim_{n \rightarrow \infty} u_n = 1$		
$\lim_{n \rightarrow \infty} u_n = +\infty$		
La suite définie par $v_n = u_n - 1$ est géométrique de raison 2		
$u_n = 2^n + 1$, pour tout entier n		

QCM 3 : Soit (u_n) une suite telle que :

- $u_0 = -1$
- (u_n) est croissante
- $(-u_n)$ est minorée par -4

Alors :

	Vrai	Faux
$\lim_{n \rightarrow \infty} u_n$ existe		
(u_n) est minorée par -1		
(u_n) est majorée par 4		
$\lim_{n \rightarrow \infty} u_n = 4$		

QCM 4 : On définit la fonction f par

- $f(x) = e^{-\frac{1}{x^2}}, x \neq 0$
- $f(0) = 0,$



Alors :

	Vrai	Faux
f est continue en 0		
f est dérivable en 0		
$f'(0) = 0$		
$f'(x) = \frac{1}{x^3} e^{-\frac{1}{x^2}}$		


QCM 5 : Soit f une fonction définie sur $[-1,1]$ et telle que :

- f est strictement décroissante
- $f(-1) \times f(1) < 0,$

Alors :

	Vrai	Faux
$f(-1) < 0, f(1) > 0$		
$f(-1) \geq 0, f(1) \leq 0$		
f s'annule sur $] -1, 1[$		
$f'(0) < 0$		

QCM 6 : Soit f une fonction dérivable dont la courbe représentative est de la forme :



Alors :

	Vrai	Faux
f est définie et continue sur $[-2, 5]$		
f' est négative sur $[0, 2]$		
L'équation de la tangente au point d'abscisse 0 est $y = 0$		
$f'(3) > 0$		

QCM 7 : Soit f une fonction définie par :

$$f(x) = e^{-\frac{1}{x}} (\ln x)$$

Alors :



	Vrai	Faux
$]0, +\infty[$ est le domaine de définition de f		
$\lim_{x \rightarrow 0^+} f(x) = 0$		
$\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = 0$		
$f'(x) = \frac{1}{x^2} (x + \ln x) f(x)$		

QCM 8 : Soit le polynôme complexe : $P(z) = 2z^3 - iz^2 + 3z + i - 5$

Alors :

	Vrai	Faux
1 est racine du polynôme P		
$P(z) = (z - 1)(2z^2 + (2 - i)z + i - 5)$		
Si $z \in \mathbb{R}$, alors $P(z) \in \mathbb{R}$		
$P(-1) \in \mathbb{R}$		

QCM 9 : Soit P une probabilité, A et B deux événements, alors

	Vrai	Faux
$P(A \cup B) = P(A) + P(B)$		
$P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(A \cap B)$		
$(A \cup B) = P(A) - P(B) + P(A \cap B)$		
$P(A \cup B) = P(A)P(B)$		