

# Groupe des Instituts Excel

## TRIANGLES: MILIEUX ET PARALLÈLES


### 1) Triangles et milieux

#### a) Théorème des milieux :

Dans un triangle ABC, la droite passant par les milieux I et J des côtés [AB] et [AC], est parallèle au 3<sup>ème</sup> côté [BC].

De plus :  $IJ = \frac{1}{2} BC$

#### Démonstration :



K est le symétrique de I par rapport à la droite  $(\Delta)$ . Donc [AC] et [IK] ont le même milieu. Donc AKCI est un parallélogramme. Donc (KC) et (AI) sont parallèles.

De plus  $KC = AI = IB$ .

Donc (KC) et (IB) sont parallèles et  $KC = IB$ .

Donc KIBC est un parallélogramme.

Donc (IJ) et (BC) sont parallèles.

De plus  $IJ = \frac{1}{2} IK = \frac{1}{2} BC$


#### b) Théorème réciproque :

Dans un triangle ABC, la droite passant par le milieu I de [AB], et qui est parallèle à [BC], coupe le 3<sup>ème</sup> côté [AC] en son milieu J.

*Démonstration : ( éventuelle ).*

### 2) Triangles et parallèles

#### Activité préparatoire :




Les droites (EI), (JF) et (KG) sont parallèles à (BC).

$AI = IJ = JK = KB$ .

1. Comparer  $\frac{AJ}{AB}$  et  $\frac{AF}{AC}$  et  $\frac{JF}{BC}$ .
2. Comparer  $\frac{AI}{AJ}$  et  $\frac{AE}{AF}$  et  $\frac{IE}{FJ}$ .
3. Comparer  $\frac{AI}{AB}$  et  $\frac{AE}{AC}$  ; et  $\frac{IE}{BC}$  ?
4. Comparer  $\frac{AI}{AK}$  et  $\frac{AE}{AG}$  ; et  $\frac{IE}{KG}$  ?
5. Comparer  $\frac{AK}{AB}$  et  $\frac{AG}{AC}$  ; et  $\frac{KG}{BC}$  ?

b) Théorème de Thalès :

Dans un triangle ABC, si I est un point du segment [AB] et si J est un point du segment [AC], et si les droites (IJ) et (BC) sont parallèles, alors on a :  $\frac{AI}{AB} = \frac{AJ}{AC} = \frac{IJ}{BC}$ .



Donc le tableau ci-dessous est un tableau de proportionnalité.

Longueurs des côtés du triangle ABC	AB	AC	BC
Longueurs des côtés du triangle AIJ	AI	AJ	IJ

c) Exemple :

ABC est un triangle tel que :  $AB = 5,4$  ;  $AC = 6,3$  ;  $BC = 9$ . M est le point de [AB] tel que :  $AM = 3$ . La parallèle à (BC) coupe [AC] en N. Calculer MN et NC. (l'unité est le cm)

M est sur le segment [AB],  
N est sur le segment [AC],  
(MN) // (BC).

D'après le théorème de Thalès,

$$\frac{AM}{AB} = \frac{AN}{AC} = \frac{MN}{BC}.$$

$$\text{Donc } \frac{3}{5,4} = \frac{AN}{6,3} = \frac{x}{9}.$$


On utilise la règle des produits en croix,

$$3 \times 9 = 5,4 \times x. \text{ D'où } x = \frac{27}{5,4} = \frac{2,7 \times 10}{2,7 \times 2}.$$

**Donc  $x = 5 \text{ cm}$ .**

De même,  $3 \times 6,3 = 5,4 \times AN$ . Donc  $AN = \frac{3 \times 6,3}{5,4} = \frac{3 \times 63}{54} = \frac{3 \times 9 \times 7}{2 \times 3 \times 9} = \frac{7}{2}$ . Donc  $AN = 3,5 \text{ cm}$ .

**Donc  $y = 6,3 - 3,5 = 2,8 \text{ cm}$ .**



### 3) Agrandissement et réduction

- a) Définition : Une figure  $\mathcal{F}'$  est un agrandissement ou une réduction d'une figure  $\mathcal{F}$  si les longueurs de la figure  $\mathcal{F}'$  sont proportionnelles aux longueurs de la figure  $\mathcal{F}$ .


Le coefficient de proportionnalité  $k$  de  $\mathcal{F}$  vers  $\mathcal{F}'$  s'appelle le coefficient d'agrandissement ou de réduction.

Si  $k < 1$ , on dit que  $\mathcal{F}'$  est une réduction de  $\mathcal{F}$ .

Si  $k > 1$ , on dit que  $\mathcal{F}'$  est un agrandissement de  $\mathcal{F}$ .

- b) Propriété : Dans une réduction ou un agrandissement, les mesures des angles sont conservées.  
Dans une réduction ou un agrandissement, le parallélisme est conservé.

- c) Exemple : Dans la figure ci-dessous,  $M \in [AB]$ ,  $N \in [AC]$  et  $(MN) \parallel (BC)$ .



D'après le théorème de Thalès,  $\frac{AM}{AB} = \frac{AN}{AC} = \frac{MN}{BC}$ .

Comme  $\frac{AM}{AB} = \frac{3}{8} < 1$ ,

le triangle AMN est une réduction du triangle ABC de coefficient  $k = \frac{3}{8}$ .